

Temporanee sospensioni (ultimo agg. 2/7/18 CF)

TEMPORANEA SOSPENSIONE DALLA DONAZIONE

Anestesia locale	1 mese
Anestesia totale	4 mesi
Ansiolitici (uso costante)	Sospensione fino a guarigione e sospensione della terapia
Ansiolitici (uso saltuario)	15 giorni
Antidepressivi (uso saltuario)	Sospensione fino a guarigione e sospensione della terapia
Antistaminici	Nessuna sospensione per SI, PL uso industriale (non si dona nella fase allergica acuta). Una settimana dalla fine della cura.
Aspirina, Analgesici	Nessuna sospensione per SI; 5 giorni per PT
Asportazione neo/ciste	1 mese (portare l'esame istologico)
Antibiotici	15 giorni
Calcioeparina	1 mese dalla fine della cura
Ciclo mestruale	1 settimana dalla fine del ciclo
Collirio cortisone	3 settimane
Comportamenti sessuali a rischio	4 mesi dall'ultima esposizione a rischio
Convivenza con soggetto positivo per HBsAg e/o HCV	Fino a 4 mesi dalla cessazione della convivenza (anche se il donatore è vaccinato per epatite B)
Cortisone	Almeno 3 settimane
Cure odontoiatriche	48 ore per cure di minore entità (pulizia, igiene dentale, ecc.); 1 settimana dalla completa guarigione clinica per estrazione dentaria non complicata, devitalizzazione e alti interventi assimilabili a interventi chirurgici minori; 4 mesi in caso di innesto di tessuto osseo.
Day Hospital	1 mese
Endoscopia o uso di cateteri (gastrosocopia, colonsocopia, ecc.)	4 mesi
Eutirox	Nessuna sospensione compatibilmente con la patologia
Farmaci anti-ipertensivi	Non assumere nella giornata di donazione. Per i CTRL nessuna sospensione.
Febbre >38°	2 settimane dopo la cessazione dei sintomi
Febbre miltese	2 anni dalla guarigione clinica
Fuoco di Sant'Antonio	6 mesi dalla scomparsa dello sfogo (ripetere IGM in ospedale)
Gastroenterite virale	15 giorni dopo la risoluzione
Gravidanza	6 mesi dal parto (eccettuate circostanze particolari e a discrezione del medico)
Herpes labialis, Herpes simplex e genitale	idoneità dopo guarigione
Immunoglobuline (epatite B, tetano)	4 mesi
Imodium	2 settimane
Influenza	15 giorni dopo la risoluzione

TEMPORANEA SOSPENSIONE DALLA DONAZIONE

Interruzione della gravidanza	6 mesi
Intervento chirurgico	1 o 4 mesi a giudizio del medico (in caso di asportazione, aspettare esame istologico).
Malaria (chi ha vissuto in zona endemica per sei mesi e per chi ha contratto patologia)	6 mesi dall'ultimo soggiorno; a fine sospensione se test immunologico è negativo si può riprendere a donare; altrimenti sospensione di 3 anni.
Malattie esantematiche (morbillo, varicella, ecc.)	2 settimane dalla scomparsa dell'esantema
Manifestazioni allergiche gravi	2 mesi dopo l'ultima esposizione
Monouril (cistite)	7-10 giorni
Oki	1 settimana
Pap - test	Nessuna sospensione
Pillola (estro progestinici)	Nessuna sospensione
Primolut-Nor (regolarizzazione ciclo)	Nessuna sospensione per PL; aspettare fine della cura per SI
Raffreddore, male di gola	15 giorni
Soggiorno in USA	28 gg dal rientro
Tatuaggi, piercing, agopuntura	4 mesi (se i CTRL non sono scaduti a fine sospensione si può tornare subito a donare)
Terapia antibiotica, antimicotica per via orale o parenterale	15 giorni; uso topico: nessuna sospensione
Terapia con cortisone per via orale o per iniezione	21 giorni; uso topico: nessuna sospensione
Vaccino antitetanica	4 mesi
Vaccino per allergie	72 ore dall'ultima dose
Vaccino per epatite B	7 giorni se il soggetto è asintomatico e se non c'è stata esposizione
Vaccino per epatite A	48 ore se il soggetto è asintomatico e se non c'è stata esposizione
Vaccinazioni per morbillo, parotite, febbre gialla, poliomelite - vaccino orale, rosolia, TBC, ecc.	4 settimane
Vaccinazioni per peste, tifo, paratifo, influenza, pertosse, difterite, colera, poliomelite, ecc.	48 ore se soggetti afebrili ed asintomatici
Vaccino per rabbia	48 ore se il soggetto è asintomatico; 1 anno dopo il morso di animale
Virus del Nilo Occidentale (WNV)	28 giorni dall'ultimo soggiorno in area a rischio infezione; 4 mesi dalla completa guarigione in caso di soggetto con diagnosi di
Virus intestinale	10 giorni dall'ultimo sintomo